

מכללת הדסה: יום עיון בנושא סלמונלה

ד"ר מאיה דוידוביץ' כהן, מנהלת המרכז הארצי לסלמונלה במשרד הבריאות: "שיעורי התחלואה נמצאים בירידה"

מיקי ביטון

צילום מגד גוזני
בתמונה מכללה
אקדמית הדסה



בדיקות לאיתור סלמונלה.

במכללת הדסה מדגישים כי "המרכז הארצי לסלמונלה הוא היחיד בארץ המסוגל להגדיר ולזהות את הסרוטיפים השונים. נהוג למיין את הסלמונלה לפי שני סוגי מחלה. הראשון: מחלת אנטרית רגילה, הגורמת לשלשולים וכאבי בטן, חולפת בדרך כלל תוך שבוע ולרוב לא גרש טיפול אנטי-ביוטי, השני, סלמונלה Typhi, מחלה שגורמת לכאבי ראש וחום. בדרך כלל לא מלווה בשלשול. מרגע הרבקה ועד המחלה עובר שבוע עד חודש. המחלה ממושכת ומחייבת טיפול אנטיביוטי. בסוג הזה התמותה גבוהה יותר. כל מקרי סלמונלה טיפי בשנים האחרונות היו מיובאים מחו"ל. כמעט כל מקרי התחלואה בסלמונלה בישראל שייכים לסוג הראשון שאינו טיפי".

ביום עיון מיוחד שהתקיים ביום רביעי שעבר בחוג למעבדה רפואית במכללה האקדמית הדסה במרכז העיר, סיפרה בין השאר ד"ר מאיה דוידוביץ' כהן, מנהלת המרכז הארצי לסלמונלה במשרד הבריאות כי "יש למעלה מ-2,600 סוגי סלמונלה, ובארץ המחלה מתפרצת לרוב בחודשים יולי-אוגוסט בשל מזג האוויר החם ובאוקטובר-נובמבר בשל תקופת החגים, אז אנחנו מרבים לאכול".

ד"ר דוידוביץ' כהן סיפרה ביום העיון כי "שיעורי התחלואה בסלמונלוזיס בישראל נמצאים בירידה החל משנת 1995. כמו כן, בקרב ילדים עד גיל שנתיים שיעורי התחלואה גבוהים במיוחד. בנוסף, מספר החולים האמיתי גבוה יותר כי מכיוון שחולים רבים כלל לא פונים לרופא או אינם מבצעים